

علاج مرض السلّ (TB) الكامن بعقار إيزونيازيد وريفابنتين (INH-RPT)

تُظهر الاختبارات التي أُجريت لك أنك مصاب بمرض السلّ (TB) الكامن أو ما يُعرف بالاختصار LTBI. يعني هذا أن جراثيم السلّ (TB) تعيش داخل جسمك وقد تصيبك بإعياء.

جدير بالذكر أن جراثيم السلّ (TB) لا تصيبك بمكروه ولا يمكنها الانتقال إلى أشخاص آخرين. فهي عبارة عن جراثيم نائمة. أما إذا استيقظت جراثيم السلّ (TB)، فقد تصيبك بإعياء. ويُطلق عليها حينئذٍ مرض السلّ (TB) النشط. يمكن أن تنتقل عدوى السلّ (TB) إلى أشخاص آخرين إذا كنت مصابًا بمرض السلّ (TB) النشط.

ماذا لو سبق لي تناول لقاح BCG؟

يُقى لقاح BCG الأطفال من الإصابة بأشكال مستفحلة من مرض السلّ (TB)؛ إلا أن ذلك يكون لبضع سنوات فقط. ولا يمكنه الوقاية من الإصابة بمرض السلّ الكامن أو مرض السلّ (TB) النشط. إذا سبق لك تناول لقاح BCG، فلا يزال بإمكانك تناول العقار لوقايتك أنت وعائلتك من الإصابة بمرض السلّ الكامن.

ماذا لو لم أستطع دفع ثمن عقار إيزونيازيد وريفابنتين (INH-RPT)؟

اسأل الطبيب أو الممرض عن كيفية الحصول على عقار علاج السلّ مجانًا من برنامج مرض السلّ التابع لوزارة الصحة بولاية مينيسوتا.



كيف يمكن الوقاية من مرض السلّ (TB) النشط؟

يمكنك تناول أدوية للوقاية من الإصابة بمرض السلّ (TB) النشط. إن إيزونيازيد وريفابنتين (INH-RPT) هما عقاران يُستخدمان معًا لعلاج مرض السلّ الكامن. فهما يقضيان على جراثيم السلّ (TB) النائمة قبل أن تصيبك بإعياء. قد يستغرق الأمر عدة شهور حتى يقضي العقار على جراثيم السلّ (TB) لأنها جراثيم قوية.

ستتقابل مع الطبيب أو الممرض مرة واحدة في الأسبوع على مدار 12 أسبوعًا للحصول على عقار إيزونيازيد وريفابنتين (INH-RPT) وتناوله. يُنصح بتناول العقار على معدة خالية. أما إذا شعرت بالألم في معدتك، فلا بأس من تناول العقار مع كمية قليلة من الطعام.

لماذا يُنصح بتناول العقار إذا كنت لا تشعر بالإعياء؟

يسهل القضاء على جراثيم السلّ (TB) النائمة قبل أن تستيقظ وتصيبك بإعياء.

ماذا سيحدث لو لم أتناول العقار؟

إذا لم تتناول عقار إيزونيازيد وريفابنتين (INH-RPT) أو نسيت تناوله لعدة أيام أو توقفت عن تناوله قبل أن يخبرك بذلك الطبيب أو الممرض، فقد تُصاب بمرض السلّ (TB) النشط. من المهم القضاء على جراثيم السلّ (TB) لكي تنعم أنت وعائلتك بصحة جيدة.



تناول العقار حسب توصيات الطبيب أو الممرض.
قد لا يكون العقار فعالاً في حالة نسيان تناوله لعدة أيام.

احتفظ بجميع مواعيد زيارتك الطبية.

سيساعدك الطبيب أو الممرض في التأكد من سير عمل خطتك العلاجية.

موعد زيارتي الطبية التالية للعلاج من مرض السل:

التاريخ:

الوقت:

الطبيب أو الممرض:

الموقع:

ماذا لو غيرت محل إقامتي؟

أخبر الطبيب أو الممرض قبل الانتقال إلى ولاية أو مدينة أخرى. حيث يمكنهما الاستمرار في مساعدتك للحصول على عقار علاج مرض السل بعد تغيير محل إقامتك.

ما الذي ينبغي معرفته عن عقار علاج مرض السل الكامن؟

- تجنب شرب البيرة أو الخمر أو الكحوليات طوال فترة العلاج من مرض السل الكامن. فقد يتسبب شرب الكحوليات أثناء تناول عقار علاج مرض السل الكامن في الإضرار بالكبد.
- أخبر طبيبك عن الأدوية الأخرى التي تتناولها.
- تجنب حدوث حمل أثناء تناول عقار إيزونيازيد وريفامبين (INH-RPT). اتصل بالطبيب أو الممرض على الفور في حالة وجود حمل.

يتناول معظم الأشخاص إيزونيازيد وريفامبين (INH-RPT) من دون مشاكل. ومع ذلك، فقد يعاني بعض الأشخاص من مشاكل، مثل:

- حمى لأكثر من ثلاثة أيام
- ضعف الشهية أو الشعور بالتعب
- ألم في المعدة أو قيء
- ألم في البطن
- بول داكن (لون الشاي أو القهوة)
- اصفرار لون البشرة أو العينين
- طفح جلدي أو حكة
- تخدير أو تنميل في اليدين أو القدمين

إذا كنت تعاني من أي من هذه المشاكل، فقم بما يلي:

1. توقف عن تناول العقار.
2. اتصل بالطبيب أو الممرض على الفور. لا تنتظر حتى موعد الزيارة القادم.