

ការព្យាបាលមេរោគជំងឺរបេង (TB) ដែលសំងំក្នុងខ្លួនដោយថ្នាំ Isoniazid និង Rifapentine (INH-RPT)

ការធ្វើតេស្តរបស់អ្នកបង្ហាញថាអ្នកមានផ្ទុកមេរោគរបេងដែលសំងំក្នុងខ្លួន ឬ LTBI ។ នេះមានន័យថាមេរោគរបេងគឺមាននៅក្នុងខ្លួនរបស់អ្នក និងអាចធ្វើឱ្យអ្នកឈឺបាន។

មេរោគរបេងមិនធ្វើឱ្យអ្នកឈឺចាប់ និងមិនអាចឆ្លងទៅមនុស្សផ្សេងទៀតទេ។ វាហាក់បីដូចជាមេរោគកំពុងតែដេកលក់។ ប្រសិនបើមេរោគរបេងភ្ញាក់ឡើង វាអាចធ្វើឱ្យអ្នកឈឺ។ នេះគេហៅថា ជំងឺរបេងសកម្ម។ អ្នកអាចចម្លងមេរោគជំងឺរបេងទៅមនុស្សផ្សេងទៀតប្រសិនបើអ្នកមានជំងឺរបេងសកម្ម។

តើខ្ញុំអាចបង្ការជំងឺរបេងសកម្មបានយ៉ាងដូចម្តេច?

អ្នកអាចប្រើថ្នាំដើម្បីបង្ការការកើតជំងឺរបេងសកម្ម។ Isoniazid និង Rifapentine (INH-RPT) គឺជាថ្នាំដែលប្រើរួមគ្នាក្នុងការព្យាបាលជំងឺ LTBI ។ ថ្នាំទាំងនេះសម្លាប់មេរោគរបេងដែលកំពុងដេកមុនពេលវាធ្វើឱ្យអ្នកឈឺ។ អាចចំណាយពេលច្រើនខែដើម្បីសម្លាប់មេរោគរបេងព្រោះវាគឺជាមេរោគខ្លាំង។ អ្នកនឹងជួបពិបាកជាមួយគ្រូពេទ្យ ឬគិលានុបដ្ឋាករបស់អ្នកមួយថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍អស់រយៈពេល 12 សប្តាហ៍ដើម្បីទទួលបាន និងទៅយកថ្នាំ INH-RPT ។ ការលេបថ្នាំដោយមិនបានទទួលទានអាហារគឺជាវិធីល្អបំផុត។ ប្រសិនបើអ្នកឆ្ងល់ពោះ យល់ល្អលេបថ្នាំជាមួយនឹងអាហារក្នុងបរិមាណតិចតួច។

ហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំគួរតែលេបថ្នាំប្រសិនបើខ្ញុំមិនមានអារម្មណ៍ឈឺ?

មេរោគរបេងដែលកំពុងដេកគឺងាយស្រួលសម្លាប់ជាងមុនពេលដែលវាភ្ញាក់ឡើងនិងធ្វើឱ្យអ្នកឈឺ។

ចុះបើខ្ញុំមិនលេបថ្នាំ?

បើសិនជាអ្នកមិនលេបថ្នាំ INH-RPT ខកខានជាច្រើនថ្ងៃឬឈប់ប្រើថ្នាំមុនពេលដែលគ្រូពេទ្យ ឬគិលានុបដ្ឋាករបស់អ្នកប្រាប់អ្នក អ្នកអាចមានជំងឺរបេងសកម្ម។ វាជាការសំខាន់ដែលត្រូវសម្លាប់មេរោគរបេងដូច្នោះអ្នកនិងគ្រួសាររបស់អ្នកមានសុខភាពល្អ។

ចុះបើខ្ញុំបានចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំង BCG?

ថ្នាំវ៉ាក់សាំង BCG ការពារកុមារមិនឱ្យកើតជំងឺរបេងធ្ងន់ធ្ងរ ប៉ុន្តែបានត្រឹមតែរយៈពេលពីរបីឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ។ វាមិនអាចការពារកុំឱ្យកើតជំងឺ LTBI ឬជំងឺរបេងសកម្ម។ ប្រសិនបើអ្នកបានចាក់វ៉ាក់សាំង BCG អ្នកគួរតែលេបថ្នាំព្យាបាលជំងឺ LTBI ដើម្បីការពារខ្លួនអ្នក និងអ្នកដទៃ។

ចុះបើខ្ញុំមិនមានលទ្ធភាពបង់ប្រាក់សម្រាប់ថ្នាំ INH-RPT?

សាកសួរគ្រូពេទ្យ ឬគិលានុបដ្ឋាករបស់អ្នកអំពីការទទួលបានថ្នាំរបេងឥតគិតថ្លៃពីកម្មវិធីរបេងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៃរដ្ឋមីនីសូតា។

ចុះបើខ្ញុំបានផ្លាស់ទីទៅឆ្ងាយ?

សូមប្រាប់គ្រូពេទ្យរបស់អ្នកមុនពេលដែលអ្នកផ្លាស់ទីទៅរដ្ឋ ឬទីក្រុងផ្សេងទៀត។ ពួកគេអាចជួយអ្នកបន្តទទួលបានថ្នាំរបេងបន្ទាប់ពីអ្នកបានផ្លាស់ទី។

ខ្ញុំគួរតែដឹងអ្វីខ្លះអំពីការប្រើថ្នាំ LTBI?

- កុំផឹកស្រាបៀរ ស្រាគ្រហម ឬស្រាហូតដល់អ្នកបញ្ចប់ការព្យាបាល LTBI របស់អ្នក។ ការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងក្នុងខណៈពេលប្រើថ្នាំ LTBI អាចប៉ះពាល់ដល់ថ្លើមរបស់អ្នក។
- ប្រាប់គ្រូពេទ្យអំពីថ្នាំដទៃទៀតដែលអ្នកកំពុងប្រើប្រាស់។
- ជៀសវាងការមានផ្ទៃពោះខណៈពេលដែលប្រើថ្នាំ INH-RPT។ ហៅទូរស័ព្ទទៅវេជ្ជបណ្ឌិតឬគិលានុបដ្ឋាករបស់អ្នកភ្លាមប្រសិនបើអ្នកមានផ្ទៃពោះ។

មនុស្សភាគច្រើនលេបថ្នាំ INH-RPT ដោយគ្មានបញ្ហា។ មនុស្សមួយចំនួនពិតជាមានបញ្ហាដូចជា៖

- ក្តៅខ្លួនអស់រយៈពេលជាងបីថ្ងៃ
- បាត់បង់ចំណង់អាហារ ឬមានអារម្មណ៍អស់កម្លាំង
- ឈឺក្រពះ និងក្អក
- មានការឈឺចាប់ត្រង់ពោះ
- ទឹកនោមពណ៌ក្រមៅ (ពណ៌តែ ឬក្រហម)
- ស្បែក ឬភ្នែកពណ៌លឿង
- កន្ទួលស្បែកឬរមាស់
- ស្លឹក ឬឈឺស្រពន់ដៃឬជើង

ប្រសិនបើអ្នកមានបញ្ហាទាំងនេះ៖

1. បញ្ឈប់ការប្រើថ្នាំរបស់អ្នក។
2. ហៅទូរស័ព្ទទៅវេជ្ជបណ្ឌិត ឬគិលានុបដ្ឋាករបស់អ្នកជាបន្ទាន់។ កុំរង់ចាំការណាត់ជួបបន្ទាប់របស់អ្នក។



លេបថ្នាំដែលគ្រូពេទ្យឬគិលានុបដ្ឋាករបស់អ្នកប្រាប់អ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកខកខានជាច្រើនថ្ងៃ ថ្នាំនេះអាចមិនមានប្រសិទ្ធភាព។ **រក្សារាល់ការណាត់ជួបគ្រូពេទ្យរបស់អ្នក។** គ្រូពេទ្យរបស់អ្នក នឹងជួយធ្វើឱ្យប្រាកដថា ការព្យាបាលរបស់អ្នកនឹងដំណើរការបានល្អ។

ការណាត់ជួបបន្ទាប់របស់ខ្ញុំទាក់ទិននឹងថ្នាំរបេង៖

- កាលបរិច្ឆេទ៖
- ពេលវេលា៖
- គ្រូពេទ្យ ឬគិលានុបដ្ឋាក៖
- ទីតាំង៖
- ទូរស័ព្ទ៖



Minnesota Department of Health
Tuberculosis (TB) Prevention and Control Program
P.O. Box 64975, St. Paul, MN 55164-0975
651-201-5414
www.health.state.mn.us/tb