

Liječenje latentne tuberkulozne infekcije (TB) Isoniazidom i Rifapentinom (INH-RPT)

Vaši nalazi pokazuju da imate latentnu tuberkuloznu infekciju ili LTBI (Latent Tuberculosis Infection). To znači da su klice tuberkuloze u Vašem tijelu i da se možete razboljeti.

Klice tuberkuloze Vam ne štete niti se mogu prenijeti na druge ljude. Čini se kao da su uspavane. Ukoliko se probude, možete se razboljeti. To se zove aktivna tuberkuloza. Ukoliko imate aktivnu tuberkulozu, možete ju prenijeti na druge ljude.

Kako mogu spriječiti pojavu aktivne tuberkuloze?

Možete piti lijekove za sprječavanje aktivne tuberkuloze. Isoniazid i Rifapentin (INH-RPT) su lijekovi koji se zajedno koriste u borbi protiv ove bolesti. Oni ubijaju uspavane klice prije nego Vas one razbole. S obzirom da su klice tuberkuloze snažne, njihovo ubijanje može potrajati mjesecima.

Tijekom dvanaest tjedana, jednom tjedno ćete posjetiti liječnika ili medicinsku sestru kako biste dobili i popili lijekove INH-RPT. Najbolje je da ove lijekove uzimate na prazan stomak. Ukoliko imate nervozan želudac, možete ih popiti uz malo hrane.

Zašto bih trebao popiti lijek ako se ne osjećam bolesnim?

Uspavane klice je mnogo lakše ubiti nego budne klice koje Vas mogu razboljeti.

Što ukoliko ne uzmem lijek?

Ukoliko ne uzmete lijekove INH-RPT, propustite previše dana ili prestanete uzimati lijek prije nego Vam liječnik ili medicinska sestra preporuče, možete se razboljeti aktivnom tuberkulozom. Važno je ubiti klice kako biste Vi i Vaša obitelj ostali zdravi.

Što ukoliko sam primio/la BCG vakcinu?

BCG vakcina djecu štiti od teških oblika tuberkuloze, ali samo tijekom nekoliko godina. Ne može ih zaštititi od LTBI niti od aktivne tuberkuloze. Ukoliko ste primili BCG vakcinu i dalje trebate piti lijekove protiv LTBI kako biste zaštitili sebe i druge.

Što ukoliko si ne mogu kupiti lijekove INH-RPT?

Tražite od liječnika ili medicinske sestre besplatan lijek protiv tuberkuloze iz programa borbe protiv tuberkuloze pri Odjelu za zdravlje Minnesota.



Što ukoliko se odselim?

Svoga liječnika ili medicinsku sestru informirajte o preseljenju u drugu državu ili grad. Oni Vam mogu pomoći da dobijete lijek protiv tuberkuloze nakon što se preselite.

Što bih trebao/la znati o liječenju latentne tuberkulozne infekcije?

- Sve do završetka liječenja nemojte piti pivo, vino niti liker. Pijenje alkohola tijekom liječenja latentne tuberkulozne infekcije može oštetiti Vašu jetru.
- Informirajte svog liječnika o lijekovima koje uzimate.
- Tijekom liječenja izbjegavajte trudnoću. Ukoliko se trudnoća dogodi, odmah se obratite svom liječniku ili medicinskoj sestri.

Većina ljudi nema nikakvih problema tijekom terapija INH-RPT lijekovima. Neki, pak, imaju sljedeće probleme:

- Groznicu koja traje dulje od tri dana
- Slab apetit i umor
- Uznemiren želudac ili povraćanje
- Bol u stomaku
- Taman urin (boje čaja ili kave)
- Žutu kožu ili oči
- Kožni osip ili svrbež
- Obamrle ruke ili noge ili trnce u rukama ili nogama

Ukoliko imate bilo koji od ovih problema:

1. Prekinite terapiju.
2. Odmah se obratite svom liječniku ili medicinskoj sestri. Nemojte čekati sljedeći zakazani pregled.



Uzmite lijek kada Vam to liječnik ili medicinska sestra kaže. Ukoliko preskočite previše dana, lijek možda neće djelovati.

Odlazite na sve zakazane preglede. Vaš liječnik ili medicinska sestra pomoći će vam da se liječenje obavi kako treba.

Moj sljedeći zakazani pregled za liječenje tuberkuloze:

Datum:

Vrijeme:

Liječnik ili medicinska sestra:

Mjesto:

Telefon:

Minnesota Department of Health
Tuberculosis (TB) Prevention and Control Program
P.O. Box 64975, St. Paul, MN 55164-0975
651-201-5414
www.health.state.mn.us/tb