



Vacuna Johnson & Johnson contra COVID-19: Lo que debería saber

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) ahora recomiendan las vacunas de mRNA contra COVID-19 (Pfizer y Moderna) en lugar de la vacuna Johnson & Johnson contra COVID-19.

¿Por qué se han actualizado las recomendaciones?

Ha habido expertos que han comprobado que, aunque poco frecuente, el problema de coagulación de la sangre después de recibir la vacuna de Johnson & Johnson contra COVID-19 causó algunas muertes. Si bien esto es algo inusual, es muy grave y hay otras vacunas disponibles que no conllevan el mismo riesgo.

Los expertos actualizaron las recomendaciones después de revisar las investigaciones más recientes sobre qué tan bien funciona Johnson & Johnson y su seguridad. Continúan revisando la seguridad de todas las vacunas y, si es necesario, actualizan sus recomendaciones según los resultados de esas investigaciones. Si existe cualquier patrón inusual o inesperado de efectos secundarios raros y graves se investiga y aborda, y se mantiene informada a la gente.



¿Qué sucede si ya recibí la vacuna de Johnson & Johnson?

Es poco probable que ahora desarrolle la rara condición de coagulación asociada con la vacuna de Johnson & Johnson si ha pasado más de un mes desde que recibió la vacuna.

Si ha pasado menos de un mes, preste atención a estos síntomas:

- Dificultad para respirar
- Dolor en el pecho
- Hinchazón en las piernas
- Dolor abdominal o de estómago que no desaparece
- Dolores de cabeza intensos o dolores de cabeza que no desaparecen
- Visión borrosa
- Moretones que aparecen fácilmente o pequeñas manchas de sangre debajo de la piel que no están limitadas al sitio de la inyección

Si tiene alguno de estos síntomas después de recibir la vacuna, debe recibir atención médica de inmediato. Dígame a su proveedor de atención médica que recibió la vacuna de Johnson & Johnson recientemente .




La vacuna de Johnson & Johnson contra COVID-19 protege y evita que una persona se enferme gravemente por COVID-19; sin embargo, las personas que recibieron una inyección de la vacuna de Johnson & Johnson deben mantenerse al día y recibir una vacuna de refuerzo dos meses después de su primera vacuna. Se recomienda Pfizer o Moderna para la vacuna de refuerzo.

¿Necesito ponerme una vacuna diferente?

No necesita comenzar de nuevo con una vacuna diferente si su primera vacuna fue la de Johnson & Johnson.

Si ya recibió una vacuna de refuerzo de Johnson & Johnson, no necesita más en este momento.

Si no ha recibido una vacuna de refuerzo, necesita una vacuna de refuerzo dos meses después de su primera vacuna. Se recomienda Pfizer o Moderna para la vacuna de refuerzo.



Vacunarse es la mejor manera de protegerse a sí mismo y a otros contra COVID-19.

Si no está vacunado, hable con su proveedor de atención médica o busque un lugar cerca de usted para vacunarse.

¿Todavía puedo recibir la vacuna de Johnson & Johnson si la quiero?

Todavía puede recibir la vacuna de Johnson & Johnson contra COVID-19 si esa es la vacuna que desea. Tenga en cuenta que, aunque son poco frecuentes, cualquier persona puede desarrollar coágulos de sangre después de recibir la vacuna. Sin embargo, los coágulos ocurren con mayor frecuencia en mujeres de 30 a 49 años. Hable con su proveedor de vacunas sobre la vacuna y sus posibles riesgos.

Mantenga su seguridad y la de los demás

Es importante que siga las recomendaciones actuales de salud pública para reducir la propagación de COVID-19. Estos pasos ayudan a respaldar el duro trabajo que están haciendo las vacunas para prevenir la propagación de COVID-19:




Use una mascarilla.



Si está enfermo, quédese en casa.



Lávese las manos.



Manténgase a 6 pies de distancia de los demás.

mn MINNESOTA

mn.gov/vaccine