

ຂໍ້ເທັດຈິງສໍາລັບຜູ້ຮັບ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ການດູແລ

ອະນຸມັດນໍາໃຊ້ສຸກເສີນ (EUA) ຂອງວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໄພ ເຊີ-ໄບໂອເທັກ ໃນການປ້ອງກັນພະຍາດໂຄໂລນາໄວຣັສ

2019

(ໂຄວິດ-19) ຂອງຄົນທີ່ມີອາຍຸ 12 ປີ ຂຶ້ນໄປ

ທ່ານໄດ້ຖືກສະເໜີຢາວັກຊີນ ໂຄວິດ-19 ໄພເຊີ-ໄບໂອເທັກ ໃນການປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄໂລນາໄວຣັສ 2019 (ໂຄວິດ-19) ທີ່ເກີດມາຈາກ SARS-CoV-2. ຂໍ້ມູນທີ່ລະບຸໃນ ຂໍ້ເທັດຈິງສະບັບນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປະໂຫຍດຂອງວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໄພເຊີ-ໄບໂອເທັກ, ທີ່ທ່ານຈະໄດ້ຮັບເນື່ອງຈາກມີການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ໃນ ປັດຈຸບັນ.

ວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໄພເຊີ-ໄບໂອເທັກ ແມ່ນວັກຊີນ ແລະ ອາດຈະຊ່ວຍໃນການປ້ອງກັນ ທ່ານຈາກໂຄວິດ-19. ບໍ່ມີອົງການອາຫານ ແລະ ຢາ ແຫ່ງໃດຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ (FDA) ອະນຸມັດໃຊ້ວັກຊີນນີ້ ເພື່ອປ້ອງກັນໂຄວິດ-19.

ອ່ານຂໍ້ເທັດຈິງນີ້ ສໍາລັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໄພເຊີ-ໄບໂອເທັກ. ຈົ່ງສົນທະນາ ກັບຜູ້ສະໜອງວັກຊີນຖ້າທ່ານມີຄໍາຖາມ. ມັນແມ່ນການເລືອກຂອງທ່ານທີ່ຈະຮັບ ວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໄພເຊີ-ໄບໂອເທັກ.

ວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໄພເຊີ-ໄບໂອເທັກ ແມ່ນການສັກຢາຊຸດ 2-ໂດສ໌, ຫ່າງກັນ 3 ອາທິດ, ເຂົ້າໃນກ້າມຊີ້ນ.

ວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໄພເຊີ-ໄບໂອເທັກ ອາດຈະບໍ່ປ້ອງກັນໝົດທຸກຄົນ.

ຂໍ້ເທັດຈິງນີ້ອາດຈະຍັງບໍ່ທັນໄດ້ແຈ້ງການ. ຂໍ້ເທັດຈິງທີ່ມີໃນປັດຈຸບັນນີ້, ກະລຸນາເຂົ້າເບິ່ງ www.cvdvaccine.com.

ສິ່ງທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະຮັບຢາວັກຊີນມີຫຍັງແດ່

ໂຄວິດ-19 ແມ່ນຫຍັງ?

ພະຍາດໂຄວິດ-19 ແມ່ນເກີດມາຈາກ ໄວຣັສໂຄໂລນາທີ່ເອີ້ນວ່າ SARS-CoV-2. ຊະນິດຂອງໂຄໂລນາ ນາໄວຣັສ ໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບກ່ອນໜ້ານີ້. ທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບໂຄວິດ-19 ຜ່ານທາງການສໍາຜັດກັບຄົນອື່ນ ທີ່ມີ ເຊື້ອໄວຣັສ. ມັນມີອິດທິພົນເຮັດໃຫ້ເປັນພະຍາດ ທາງເດີນຫາຍໃຈທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ອະໄວຍະວະອື່ນໆນໍາ ດ້ວຍ. ຄົນທີ່ເປັນໂຄວິດ-19 ທີ່ໄດ້ຮັບການລາຍງານຈະມີອາການເຈັບປ່ວຍຫຼາຍຮູບແບບ. ອາການອາດ ຈະເກີດຂຶ້ນ 2 ຫາ 14 ວັນ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ຮັບໄວຣັສ. ອາການອາດລວມມີ: ເປັນໄຂ້ ຫຼື ໜາວສັ້ນ; ໄອ; ຫາຍໃຈຖີ່; ອ່ອນເພຍ; ເຈັບກ້າມຊີ້ນ ແລະ ຮ່າງກາຍ; ເຈັບຫົວ; ເສຍປະສາດສໍາພັດ ຂອງລົດຊາດ ແລະ ກິນ; ເຈັບຄໍ; ຕັນດັງ ຫຼື ຂີ້ມູກຍ້ອຍ; ວິນຫົວ ຫຼື ປວດຮາກ; ຖອກທ້ອງ.

ວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໄພເຊີ-ໄບໂອເທັກ ແມ່ນຫຍັງ?

ວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໄພເຊີ້-ໄບໂອເທັກ ແມ່ນວັກຊີນທີ່ຍັງບໍ່ທັນຖືກຮັບຮອງວ່າຊ່ວຍໃນການ ປ້ອງກັນໂຄວິດ-19. ບໍ່ມີການອະນຸຍາດຈາກອົງການອາຫານ ແລະ ຢາຂອງສະຫະລັດ ອາເມລິກາ FDA-ວ່າເປັນວັກຊີນ ປ້ອງກັນໂຄວິດ-19.

ອົງການອາຫານ ແລະ ຢາຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ (FDA) ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ນຳໃຊ້ ສຸກເສີນວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໄພເຊີ້-ໄບໂອເທັກ ໃນການປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ໃນຄົນທີ່ມີອາຍຸ 12 ປີ ຂຶ້ນໄປ ພາຍໃຕ້ການອະນຸມັດ ໃຫ້ນຳໃຊ້ສຸກເສີນ (EUA).

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໃນການອະນຸມັດການນຳໃຊ້ສຸກເສີນ (EUA), ເບິ່ງ“ການອະນຸມັດການ ນຳໃຊ້ສຸກເສີນ (EUA) ແມ່ນຫຍັງ?” ພາກສຸດທ້າຍຂອງຂໍ້ເທັດຈິງນີ້.

ທ່ານຄວນຈະໃຫ້ຄຳແນະນຳແນວໃດຕໍ່ຜູ້ທີ່ຈະສັກຢາໃຫ້ແກ່ທ່ານກ່ອນທີ່ທ່ານຈະຮັບຢາ ວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໄພເຊີ້-ໄບໂອເທັກ?

ບອກຜູ້ທີ່ຈະສັກຢາວັກຊີນກ່ຽວກັບເງື່ອນໄຂທາງການແພດຂອງທ່ານ, ລວມທັງຖ້າທ່ານ:

- ມີອາການແພ້
- ມີພະຍາດອັກເສບກ້າມຊີ້ນຫົວໃຈ (ການອັກເສບກ້າມຊີ້ນຫົວໃຈ) ຫຼື ເຫຍື້ອຫຸ້ມຫົວໃຈອັກເສບ (ການອັກເສບຂອງເສັ້ນນອກຫົວໃຈ)
- ເປັນໄຂ້
- ມີອາການເລືອດໄຫຼຜິດປົກກະຕິ ຫຼື ເປັນໂຮກເສັ້ນເລືອດຕິບ
- ພວກພູມຕ້ານທານບົກພ່ອງ ຫຼື ມີຢາທີ່ມີຜົນຕໍ່ລະບົບພູມຕ້ານທານຂອງທ່ານ
- ກຳລັງຖືພາ ຫຼື ວາງແຜນທີ່ຈະຖືກພາ
- ກຳລັງໃຫ້ນົມລູກ
- ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຊະນິດອື່ນ
- ເຄີຍເປັນລົມຍ້ອນການສັກຢາ

ຜູ້ໃດທີ່ຄວນຈະຮັບຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໄພເຊີ້-ໄບໂອເທັກ?

ອົງການອາຫານ ແລະ ຢາຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ (FDA) ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ນຳໃຊ້ ສຸກເສີນວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໄພເຊີ້-ໄບໂອເທັກ ໃນບຸກຄົນທີ່ມີອາຍຸ 12 ປີ ຂຶ້ນໄປ.

ຜູ້ໃດທີ່ບໍ່ຄວນ ຮັບວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໄພເຊີ້-ໄບໂອ?

ທ່ານບໍ່ຄວນຮັບວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໄພເຊີ້-ໄບໂອເທັກ ຖ້າວ່າທ່ານ:

- ມີອາການແພ້ຮຸນແຮງພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ສັກຢາວັກຊີນເຂັມທີ່ຜ່ານມາ
- ມີອາການແພ້ຮຸນແຮງໃນສ່ວນປະສົມຂອງວັກຊີນຊະນິດນີ້

ວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໄພເຊີ້-ໄບໂອເທັກ ມີສ່ວນປະສົມຫຍັງແດ່? ວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໄພເຊີ້-ໄບໂອເທັກ ລວມມີສ່ວນປະສົມດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: mRNA, ໄຂມັນ ((4-ຮາຍໂດຊີບີ ໂດຣ) azanediyl) bis (hexane-6,1-diyl) bis (2-hexyldecanoate), 2 [(polyethylene glycol)-2000]-N,N-ditetradecylacetamide, 1,2-Distearoyl-sn-glycero-3- phosphocholine, and cholesterol), ໂປຕັດຊຽມໂຄລາຍ, ໂມໂນເບຊິກ ໂປຕັດຊຽມ ໂພດເພດ, ໂຊດຽມຄໍລາຍ, ໄດເບຊິກ ໂຊດຽມໂພເພດ ໄດຮາຍເດດສ໌, ແລະ ຊູໂຄຣສ໌.

ວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໄຟເຊີ້-ໄບໂອເທັກ ຈະໃສ່ໃຫ້ທ່ານແນວໃດ?

ວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໄຟເຊີ້-ໄບໂອເທັກ ຈະໃສ່ໃຫ້ແກ່ທ່ານໂດຍການສັກເຂົ້າໃນກ້າມຊີ້ນ.

ວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໄຟເຊີ້-ໄບໂອເທັກ ແມ່ນການສັກຢາວັກຊີນແບບຊຸດ 2 ເຂັມ ຫ່າງກັນ 3 ອາທິດ.

ຖ້າທ່ານໄດ້ສັກວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຂອງໄຟເຊີ້-ໄບໂອເທັກ ເຂັມທຳອິດ, ຫຼັງຈາກນັ້ນ 3 ອາທິດທ່ານຈະໄດ້ຮັບວັກຊີນຊະນິດດຽວກັນ ເຂັມທີສອງ ເປັນອັນວ່າສຳເລັດຊຸດຢາວັກຊີນ.

ວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຂອງໄຟເຊີ້-ໄບໂອເທັກ ໄດ້ມີການນຳໃຊ້ກ່ອນໜ້ານີ້ບໍ່?

ວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຂອງໄຟເຊີ້-ໄບໂອເທັກແມ່ນວັກຊີນທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການຍັງຢືນ. ໃນທົດລອງທາງ ການແພດ, ປະມານ 23,000 ຄົນທີ່ມີອາຍຸ 12 ປີ ຂຶ້ນໄປໄດ້ຮັບ ວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຂອງໄຟເຊີ້-ໄບໂອ ເທັກ ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ໂດສ.

ວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຂອງໄຟເຊີ້-ໄບໂອເທັກມີປະໂຫຍດຫຍັງ?

ໃນການທົດລອງທາງດ້ານການແພດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຂອງໄຟເຊີ້-ໄບໂອເທັກ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນການປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ໂດຍການຕິດຕາມສັກ 2 ເຂັມ ຫ່າງ ກັນ 3 ອາທິດ. ໄລຍະຂອງການປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ປັດຈຸບັນຍັງບໍ່ທັນຮູ້ຈັກ.

ວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໄຟເຊີ້-ໄບໂອເທັກ ມີຄວາມສ່ຽງຫຍັງແດ່?

ມີໂອກາດທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້ຍາກທີ່ວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໄຟເຊີ້-ໄບໂອເທັກຈະມີອາການແພ້ຂັ້ນຮຸນແຮງ. ອາການແພ້ຂັ້ນຮຸນແຮງ ມັກຈະເກີດຂຶ້ນພາຍໃນສອງ-ສາມນາທີຫາໜຶ່ງຊົ່ວໂມງ ພາຍຫຼັງທີ່ສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໄຟເຊີ້-ໄບໂອເທັກ. ສຳລັບເຫດຜົນນີ້, ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການສັກຢາແກ່ທ່ານຈະຖາມທ່ານເພື່ອໃຫ້ພັກຢູ່ໃນສະຖານທີ່ທີ່ທ່ານສັກຢາວັກຊີນເພື່ອທີ່ຈະຕິດຕາມທ່ານພາຍຫຼັງທີ່ຮັບການສັກຢາວັກຊີນ. ອາການຂອງປະຕິກິລິຍາຮຸນແຮງລວມມີ:

- ຫາຍໃຈຍາກ
- ໜ້າ ແລະ ຄໍໃຄໍ
- ຫົວໃຈເຕັ້ນໄວ
- ເປັນຜິ່ນຂຶ້ນຫົວຮ່າງກາຍ
- ວິນຫົວ ແລະ ອ່ອນເພຍ

ພະຍາດກ້າມຊີ້ນຫົວໃຈອັກເສບ (ການອັກເສບຂອງກ້າມຊີ້ນຫົວໃຈ) ແລະ ເຫຍື້ອຫຸ້ມຫົວໃຈອັກເສບ (ການອັກເສບຂອງເສັ້ນນອກຫົວໃຈ) ຈະເກີດຂຶ້ນກັບບາງຄົນທີ່ໄດ້ຮັບວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໄຟເຊີ້-ໄບໂອເທັກ. ໃນຄົນສ່ວນຫຼາຍ, ອາການຈະເລີ່ມຂຶ້ນພາຍໃນສອງສາມມື້ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ຮັບຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໄຟເຊີ້-ໄບໂອເທັກ ເຂັມທີສອງ. ໂອກາດໃນການເກີດຂຶ້ນແມ່ນຕໍ່າທີ່ສຸດ. ໄປພົບແພດທັນທີຖ້າທ່ານມີອາການໃດໜຶ່ງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ຮັບວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໄຟເຊີ້-ໄບໂອເທັກ:

- ເຈັບໜ້າເອິກ
- ຫາຍໃຈຖີ່ແລະສັ່ນ
- ມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າຫົວໃຈເຕັ້ນໄວ, ຫົວໃຈສັ່ນ ຫຼື ຫົວໃຈເຕັ້ນແຮງຜິດປົກກະຕິ.

ຜົນຂ້າງຄຽງທີ່ຖືກລາຍງານຂອງວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໄຟເຊີ້-ໄປໂອເທັກ ລວມມີ:

- ອາການແພ້ທີ່ຮຸນແຮງ
- ອາການແພ້ທີ່ຮຸນແຮງເຊັ່ນ ຜິນ, ຄັນ, ລົມບ້າໝູ, ຫຼື ໜ້າໃຄ່
- ພະຍາດກ້າມເນື້ອອັກເສບ (ການອັກເສບກ້າມຊິ້ນຫົວໃຈ)
- ເຫຍື້ອຫຸ້ມຫົວໃຈອັກເສບ (ການອັກເສບຂອງເສັ້ນນອກຫົວໃຈ)
- ປວດບໍລິເວນທີ່ສັກຢາ
- ເມື່ອຍ
- ເຈັບຫົວ
- ເຈັບກ້າມເນື້ອ
- ໜາວສັ້ນ
- ປວດຕົນໂຕ
- ເປັນໄຂ້
- ໃຄ່ບໍລິເວນທີ່ສັກຢາ
- ເປັນສີແດງບໍລິເວນທີ່ສັກຢາ
- ປວດຮາກ
- ຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍ
- ຕ່ອມນ້ຳເຫຼືອງໃຄ່ (ຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງຕ່ອມນ້ຳເຫຼືອງ)
- ຖອກທ້ອງ
- ປວກຮາກ
- ເຈັບແຂນ

ຜົນຂ້າງຄຽງຂອງວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໄຟເຊີ້-ໄປໂອເທັກເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະບໍ່ເກີດຂຶ້ນທັງໝົດ. ຜົນຂ້າງຄຽງທີ່ຮຸນແຮງ ແລະ ຄາດບໍ່ເຖິງອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ໄຟເຊີ້-ໄປໂອເທັກ ໂຄວິດ-19. ວັກຊີນຍັງສືບຕໍ່ສຶກສາໃນທາງການແພດ.

ຂ້າພະເຈົ້າຄວນຈະເຮັດແນວໃດກ່ຽວກັບຜົນຂ້າງຄຽງ?

ຖ້າທ່ານມີປະສົບການຂອງການແພ້ຢາທີ່ຮຸນແຮງ, ໂທຫາ 9-1-1, ຫຼື ໄປໂຮງໝໍທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດ.

ໂທຫາຜູ້ທີ່ສັກຢາໃຫ້ແກ່ທ່ານ ຫຼື ຜູ້ສະໜອງການປິ່ນປົວຂອງທ່ານ ຖ້າທ່ານມີຜົນຂ້າງຄຽງທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບທ່ານ ຫຼື ບໍ່ເຊົາ.

ລາຍງານຜົນຂ້າງຄຽງທາງອົງການອາຫານ ແລະ ຢາຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ (FDA)/CDC ລະບົບການລາຍງານເຫດການທີ່ບໍ່ດີຕໍ່ວັກຊີນ(VAERS). ເບີໂທລະສັບພຣີຂອງ VAERS 1-800-822-7967 ຫຼື ລາຍງານຜ່ານທາງອອນລາຍ ຫາ <https://vaers.hhs.gov/reportevent.html>. ກະລຸນາ ລະບຸ “ວັກຊີນ ໂຄວິດ-19 ໄຟເຊີ້-ໄປໂອເທັກ EUA” ໃນແຖວທຳອິດຂອງ ບ່ອກ #18 ຂອງຟອມລາຍງານ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດລາຍງານຜົນຂ້າງຄຽງ ເຖິງບໍລິສັດໄພເຊີ້. ທີ່ເບີຕິດຕໍ່ສະໜອງຂໍ້ມູນຂ້າງລຸ່ມນີ້.

ເວັບໄຊທ໌	ເບີແຟັກ	ເບີໂທລະສັບ
www.pfizersafetyreporting.com	1-866-635-8337	1-800-438-1985

ທ່ານຍັງອາດຈະໄດ້ຮັບທາງເລືອກໃນການລົງທະບຽນໃນ ວີ-ເຊີ (v-safe). V-safe (ວີ-ເຊີ) ແມ່ນ ເຄື່ອງມືສະໝັກໃຈທາງໂທລະສັບສະມາດໂຟນໃໝ່ ຊຶ່ງເປັນເຄື່ອງມືໃນການສົ່ງຂໍ້ຄວາມ ແລະ ການສຳຫຼວດ ທາງເວັບໄຊທ໌ ໃນການກວດຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນ ເພື່ອລະບຸເຖິງທ່າແຮງໃນການເກີດຜົນກະທົບ ຂ້າງຄຽງຫຼັງຈາກທີ່ຮັບຢາໂຄວິດ-19. ວີ-ເຊີ ຖາມຄຳຖາມທີ່ຈະຊ່ວຍ CDC ຕິດຕາມຄວາມປອດໄພຂອງ ວັກຊີນໂຄວິດ-19. ວີ-ເຊີ ຍັງແຈ້ງເຕືອນໃຫ້ໄປຮັບຢາເຂັມທີສອງ ຖ້າຕ້ອງການ ແລະ ລາຍງານຕິດຕາມ ທາງໂທລະສັບຈາກ CDC ຖ້າຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມລາຍງານຜົນກະທົບດ້ານສຸຂະພາບທີ່ສຳຄັນ ພາຍຫຼັງທີ່ສັກຢາ ວັກ ຊີນໂຄວິດ-19. ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບວິທີການສະໝັກ, ເຂົ້າເບິ່ງ: www.cdc.gov/vsafe.

ຖ້າຂ້ອຍຕັດສິນໃຈທີ່ຈະບໍ່ຮັບວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໄພເຊີ້-ໄບໂອເທັກ ຈະເປັນແນວໃດ? ມັນເປັນທາງເລືອກ ຂອງທ່ານທີ່ຈະຮັບ ຫຼື ບໍ່ຮັບວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໄພເຊີ້-ໄບໂອເທັກ. ຖ້າທ່ານຕັດສິນໃຈ ທີ່ຈະບໍ່ຮັບມັນ, ມັນ ຈະບໍ່ມີຫຍັງປ່ຽນແປງໃນການປິ່ນປົວຂັ້ນພື້ນຖານຂອງທ່ານ.

ມີທາງເລືອກອື່ນບໍ່ທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ ສຳລັບການປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ນອກຈາກວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຂອງໄພເຊີ້-ໄບໂອເທັກ?

ປັດຈຸບັນ, ຍັງບໍ່ມີການຢັ້ງຢືນ ວັກຊີນຫຼາກຫຼາຍຊະນິດທີ່ໃຊ້ໃນການປ້ອງກັນຂອງໂຄວິດ-19. ວັກຊີນ ອື່ນໆ ທີ່ໃຊ້ໃນການປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ອາດຈະມີພາຍໃຕ້ການອະນຸຍາດໃຫ້ນຳໃຊ້ສຸກເສີນ

ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດໃຊ້ວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຂອງໄພເຊີ້-ໄບໂອເທັກ ຮ່ວມກັບວັກຊີນຂອງຊະນິດອື່ນໆໄດ້ບໍ່? ຍັງບໍ່ມີຂໍ້ມູນໃນການນຳໃຊ້ວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຂອງໄພເຊີ້-ໄບໂອເທັກ ຮ່ວມກັບວັກຊີນຊະນິດ ອື່ນໆ.

ຖ້າຂ້ອຍຖືພາ ຫຼື ຢູ່ໃນໄລຍະການໃຫ້ນົມລູກຢູ່ຈະເປັນແນວໃດ?

ຖ້າທ່ານຖືພາ ຫຼື ຢູ່ໃນໄລຍະການໃຫ້ນົມລູກ, ປຶກສາທາງເລືອກຂອງທ່ານກັບຜູ້ສະໜອງ ການດູແລສຸຂະ ພາບຂອງທ່ານ.

ວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໄພເຊີ້-ໄບໂອເທັກ ຈະສາມາດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າເປັນໂຄວິດ-19 ໄດ້ບໍ່?

ບໍ່. ວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໄພເຊີ້-ໄບໂອເທັກ ບໍ່ມີເຊື້ອ SARS-CoV-2 ແລະ ບໍ່ສາມາດ ໃຫ້ທ່ານເປັນໂຄວິດ-19.

ເກັບຮັກສາບັດສັກຢາຂອງທ່ານ


ເມື່ອທ່ານໄດ້ຮັບຢາຄັ້ງທຳອິດ, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບບັດສັກຢາວັກຊີນ ເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນ ເມື່ອທ່ານກັບຄືນໄປ ສັກເຂັມທີສອງຂອງວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໄພເຊີ້-ໄບໂອເທັກ. ຈື່ໄວ້ວ່າຕ້ອງ ເອົາບັດໄປນຳໃນເວລາໄປສັກຢາ

ເຂັມທີສອງ.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

ຖ້າທ່ານມີຄໍາຖາມ, ເຂົ້າເບິ່ງທີ່ເວັບໄຊທ໌ ຫຼື ໂທຫາເບີໂທລະສັບຜູ້ສະໜອງຂ້າງລຸ່ມນີ້.

ເຂົ້າເຖິງຂໍ້ເທັດຈິງທີ່ມີໃນປັດຈຸບັນ, ກະລຸນາສະແກນ ຄິວອາໂຄດ (QR code) ທີ່ລະບຸຂ້າງລຸ່ມນີ້.

ເວັບໄຊທ໌ທົ່ວໂລກ	ເບີໂທລະສັບ
www.cvdvaccine.com 	1-877-829- 2619

ຂ້ອຍສາມາດຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມໄດ້ແນວໃດ?

- ຖາມຜູ້ສະໜອງການຮັບຢາວັກຊີນ.
- ເຂົ້າເບິ່ງ CDC ທີ່ <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html>.
- ເຂົ້າເບິ່ງ ອົງການອາຫານ ແລະ ຢາສະຫະລັດອາເມລິກາ (FDA) ທີ່ <https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization>.
- ຕິດຕໍ່ຫາພະແນກສາທາລະນະສຸກທ້ອງຖິ່ນ ຫຼື ລັດຂອງທ່ານ.

ຂໍ້ມູນການສັກຢາວັກຊີນຂອງຂ້ອຍຈະຖືກບັນທຶກຢູ່ໃສ?

ຜູ້ສະໜອງການສັກຢາຂອງທ່ານອາດຈະລວມເຖິງຂໍ້ມູນການສັກຢາລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບການ ສັກຢາກັນພະຍາດ (IIS) ຫຼື ລະບົບທີ່ກຳນົດອື່ນໆໃນລັດ/ທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ. ນີ້ຈະໝັ້ນໃຈວ່າທ່ານ ຈະໄດ້ຮັບວັກຊີນຊະນິດດຽວກັນເມື່ອທ່ານກັບຄືນມາສັກຢາວັກຊີນເປັນ ເຂັມທີສອງ. ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ IISs ເຂົ້າເບິ່ງ: <https://www.cdc.gov/vaccines/programs/iis/about.html>.

ຂ້ອຍຈະຖືກຮຽກເກັບເງິນຄ່າທຳນຽມການບໍລິການສຳລັບການຮັບຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ບໍ່?

ບໍ່. ໃນຂະນະນີ້, ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການສັກຢາບໍ່ສາມາດເກັບເງິນຄ່າບໍລິການສັກຢາຂອງທ່ານ ແລະ ທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ເສຍເງິນຢາທີ່ບໍ່ຢູ່ໃນສະຕ່ອກ ຫຼື ຄ່າທຳນຽມໃດໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຜູ້ທີ່ສະໜອງຢາວັກຊີນອາດຈະຮຽກເກັບເງິນຄືນຈາກໂຄງການ ຫຼື ແຜນການທີ່ຄຸ້ມຄອງການບໍລິການຄ່າທຳນຽມສຳລັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບວັກຊີນໂຄວິດ-19 (ປະກັນໄພສ່ວນຕົວ, ການປົນປົວສຸຂະພາບ, Medicaid, ຊັບພະຍາກອນສຸຂະພາບ & ການບໍລິການ [HRSA] ໂຄວິດ-19 ໂຄງການທີ່ບໍ່ແມ່ນຜູ້ ປະກັນໄພສຳລັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບທີ່ບໍ່ມີປະກັນໄພ).

ຂ້ອຍສາມາດລາຍງານກໍລະນີທີ່ສົງໄສວ່າເປັນການສົ່ງໂກງໄດ້ຢູ່ໃສ?

ບຸກຄົນທີ່ຮູ້ເຖິງການລະເມີດຂໍ້ກຳນົດຂອງໂຄງການວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຂອງ CDC ທີ່ອາດຈະ ເກີດ

ຂຶ້ນຄວນລາຍງານຫາຫ້ອງການສຳນັກງານຜູ້ກວດກາທົ່ວໄປຂອງສະຫັດລັດອາເມລິກາ. ພະແນກ ສຸຂະພາບ ແລະ ການບໍລິການມະນຸດ, ທີ່ 1-800-HHS-TIPS ຫຼື <https://TIPS.HHS.GOV>.

ໂຄງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະເທດມີຫຍັງແດ່?

ໂຄງການຊົດເຊີຍການບາດເຈັບ (CICP) ແມ່ນໂຄງການຂອງລັດຖະບານກາງທີ່ອາດຈະຊ່ວຍຈ່າຍຄ່າປົນປົວ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆຂອງຄົນບາງຄົນ ເຊິ່ງເປັນຜູ້ທີ່ຖືກບາດເຈັບ ຮຸນແຮງຈາກການໃຊ້ຢາ ຫຼື ຮັບວັກຊີນ, ລວມທັງວັກຊີນນີ້. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ການຂໍຮັບ ເງິນຄືນຕ້ອງໄດ້ຍືນໄປຫາ CICP ພາຍໃນ (1) ປີຈາກມື້ທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບວັກຊີນ. ເພື່ອຮຽນຮູ້ ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບໂຄງການ, ເຂົ້າເບິ່ງwww.hrsa.gov/cicp/ ຫຼື ໂທ 1-855-266-2427.

ການອະນຸຍາດນຳໃຊ້ສຸກເສີນ (EUA) ແມ່ນຫຍັງ?

ອົງການອາຫານ ແລະ ຢາຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ FDA ໄດ້ໃຫ້ຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຂອງໄພເຊີ້-ໄບໂອເທັກ ພາຍໃຕ້ກົນໄກການເຂົ້າເຖິງສຸກເສີນທີ່ເອີ້ນວ່າ ການອະນຸຍາດ ນຳໃຊ້ສຸກເສີນ (EUA). EUA ແມ່ນການສະໜັບສະໜູນຂອງເລຂາທິການສຸຂະພາບ ແລະ ການບໍລິການມະນຸດ (HHS) ໄດ້ຖະແຫລງວ່າ ສະຖານະການຂອງການລະບາດມີຢູ່ ແລະ ເພື່ອຍັງຍືນການນຳໃຊ້ຢາ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຊີວະພາບ ສຸກເສີນ ໃນໄລຍະການຄຸ້ມຄອງ ລະບາດຂອງໂຄວິດ-19.

ວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໄພເຊີ້-ໄບໂອເທັກ ບໍ່ໄດ້ຜ່ານການກວດກາແບບດຽວກັນກັບຜະລິດ ຕະພັນທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ ອົງການອາຫານ ແລະ ຢາ ຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ (FDA). ອົງການອາຫານ ແລະ ຢາຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ(FDA) ອາດຈະອະນຸ ມັດການນຳໃຊ້ສຸກເສີນ (EUA) ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂສະເພາະໃດໜຶ່ງ, ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍ ການບໍ່ມີທາງເລືອກທີ່ພຽງພໍ, ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໃຫ້ເປັນທາງເລືອກ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການຕັດສິນໃຈຂອງອົງການອາຫານ ແລະ ຢາ (FDA) ແມ່ນອີງໃສ່ຫຼັກຖານວິທະຍາສາດລວມທັງໝົດທີ່ມີຢູ່ວ່າການຜະລິດອາດຈະມີປະສິດທິຜົນໃນການປ້ອງກັນ ໂຄວິດ-19 ໃນລະຫວ່າງ ໂຄວິດ-19ລະບາດ ເຊິ່ງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກ ແລະ ມີແນວໂນ້ມທີ່ມີຜົນປະໂຫຍດ ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງຂອງຜະລິດຕະພັນ. ມາດຕະຖານທັງໝົດເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງ ໄດ້ຮັບການຕອບສະໜອງເພື່ອໃຫ້ຜະລິດຕະພັນຖືກນຳໄປໃຊ້ເຂົ້າໃນການປົນປົວຄົນເຈັບໃນໄລຍະການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19.

ການອະນຸມັດນຳໃຊ້ເວລາສຸກເສີນ (EUA) ສຳລັບວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໄພເຊີ້-ໄບໂອເທັກ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ ໃນໄລຍະການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 EUA ພຽງແຕ່ແຈ້ງໃຫ້ການ ອະນຸມັດນຳໃຊ້ຜະລິດຕະພັນເຫຼົ່ານີ້ ໃນເວລາສຸກເສີນ, ຍົກເວັ້ນແຕ່ວ່າຈະຢຸດ ຫຼື ຍົກເລີກ (ຫຼັງຈາກທີ່ຜະລິດຕະພັນດັ່ງກ່າວອາດຈະບໍ່ໃຫ້ນຳໃຊ້ ອີກຕໍ່ໄປ).



ຜະລິດໂດຍ
Pfizer Inc., New York, NY 10017



ຜະລິດຕະພັນສໍາລັບ

BioNTech Manufacturing GmbH

An der Goldgrube 12

55131 Mainz, Germany

LAB-1451-4.2a

ປັບປຸງ: 25 ມິຖຸນາ 2021



ສະແກນເພື່ອເກັບກຳຂໍ້ເທັດຈິງທີ່ສະໜອງໃຫ້ຜູ້ຮັບ ວັກຊີນເພື່ອເກັບກຳ
ການປິ່ນປົວທາງເອເລັກໂຕນິກ /ລະບົບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບພູມຕຳນາທານ.

ວັນທີບາໂຄດ: 05/2021