


КІР – ЦЕ НЕ ПРОСТО ВИСИП



Кір може бути особливо небезпечним для немовлят і дітей молодшого віку.

До характерних симптомів кору належать:



Висока температура
(подекуди вища за 40 °C)



Кашель



Нежить



Почервоніння очей,
сльозотеча



Висип
(зазвичай з'являється через 3–5 днів після появи симптомів)

Кір може мати серйозні наслідки.

Він може спричинити тяжкі ускладнення, зокрема пневмонію, запалення головного мозку (енцефаліт) та навіть смерть.



Кожен п'ятий хворий на кір потребує госпіталізації.



У кожній 20-ї дитини, хворої на кір розвивається пневмонія – найпоширеніша причина смерті від кору серед дітей молодшого віку.



У одного з тисячі хворих на кір розвивається енцефаліт, що може призвести до ураження головного мозку



Смертність від кору складає від 1 до 3 осіб на 1000 випадків захворювання.

Довгострокові наслідки

Підгострий склерозивний паненцефаліт – вкрай рідкісне, але смертельне захворювання, яке може розвинути через 7–10 років після перенесення кору.



Вам під силу захистити свою дитину.

Подбайте про надійний і тривалий захист своїх дітей від кору, зробивши їм щеплення від кору, паротиту та краснухи (КПК). Проконсультуйтеся зі своїм лікарем.



www.cdc.gov/measles