


# Trẻ em lớn và thanh thiếu niên cũng cần chủng ngừa!

Lịch trình chủng ngừa đề nghị cho trẻ em từ 7–18 tuổi năm 2024

Quý vị muốn tìm hiểu thêm?

Quét mã QR này để biết con em quý vị có thể cần loại thuốc chủng ngừa nào. Hoặc vào trang mạng [www.cdc.gov/vaccines/tool/teen.html](http://www.cdc.gov/vaccines/tool/teen.html)



<sup>1</sup> Nên chích một liều Tdap trong mỗi lần mang thai

## LƯU Ý

**TẤT CẢ** trẻ em trong nhóm tuổi nên được chích  
chuỗi chủng ngừa này

**MỘT SỐ** trẻ em trong nhóm tuổi nên được chích  
chuỗi chủng ngừa này

**TẤT CẢ** trẻ em trong nhóm tuổi có thể chích  
chuỗi chủng ngừa này

Cha mẹ/người chăm sóc nên nói chuyện với nhà  
cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe để quyết  
định xem loại thuốc chủng ngừa này có phù hợp  
với con em mình hay không

Nói chuyện với bác sĩ của con em quý vị để được hướng dẫn thêm nếu:

- Con em quý vị có bệnh trạng nào khiến em có nguy cơ bị nhiễm trùng cao hơn hoặc đang mang thai.
- Con em quý vị đi du lịch bên ngoài Hoa Kỳ.
- Con em quý vị lỡ không được chích loại thuốc chủng ngừa được đề nghị nào cho độ tuổi của em hoặc cho em bé và trẻ nhỏ.

[www.cdc.gov/vaccines](http://www.cdc.gov/vaccines)

## ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN

Gọi số điện thoại miễn phí: **1-800-CDC-INFO (1-800-232-4636)**

Hoặc vào trang: [www.cdc.gov/vaccines/parents](http://www.cdc.gov/vaccines/parents)

# Những loại thuốc chủng ngừa này phòng ngừa bệnh gì?

BỆNH CÓ THỂ PHÒNG NGỪA ĐƯỢC BẰNG THUỐC CHỦNG NGỪA	BIẾN CHỨNG CỦA BỆNH	SỐ LIỀU THUỐC CHỦNG NGỪA
<b>HPV (Siêu vi gây u nhú ở người)</b> Tình trạng nhiễm siêu vi truyền nhiễm, lây qua sự tiếp xúc da kề da, kẽ cùi khi quan hệ tình dục	Mun cóc vùng sinh dục và nhiều loại ung thư sau này trong đời, bao gồm ung thư cổ tử cung, âm đạo, dương vật, hậu môn và cổ họng	2 hoặc 3 liều
<b>Uốn ván (Cứng hàm)*</b> Nhiễm trùng do các bào tử vi khuẩn ở trong đất và bụi khắp nơi; bào tử xâm nhập vào cơ thể qua vết thương hoặc da bị trầy xước	Co giật, gãy xương, khó thở, tử vong	1 liều vào năm 11-12 tuổi Chích thêm liều nếu lúc thơ ấu không được chích 1 liều cho vết thương bẩn
<b>Bệnh bạch hầu*</b> Tình trạng nhiễm vi khuẩn truyền nhiễm ở mũi, họng và đồi khi là phổi; lây qua không khí và tiếp xúc trực tiếp	Sưng cơ tim, suy tim, hôn mê, té liệt, tử vong	1 liều vào năm 11-12 tuổi Chích thêm liều nếu lúc thơ ấu không được chích
<b>Ho gà*</b> Tình trạng nhiễm vi khuẩn truyền nhiễm ở phổi và đường thở; lây qua không khí và tiếp xúc trực tiếp	Nhiễm trùng phổi (viêm phổi), tử vong; đặc biệt nguy hiểm cho em bé	1 liều vào năm 11-12 tuổi Chích thêm liều nếu lúc thơ ấu không được chích 1 liều mỗi lần mang thai
<b>Viêm màng não**</b> Tình trạng nhiễm vi khuẩn truyền nhiễm ở màng não và tủy sống hoặc máu; lây qua không khí và tiếp xúc trực tiếp	Mất cánh tay hoặc chân, điếc, co giật, tử vong	2 liều Có thể cần thêm liều tùy thuộc vào bệnh trạng hoặc loại thuốc chủng ngừa sử dụng.
<b>Cúm (Bệnh cúm)</b> Tình trạng nhiễm siêu vi truyền nhiễm ở mũi, họng và đồi khi là phổi; lây qua không khí và tiếp xúc trực tiếp	Nhiễm trùng phổi (viêm phổi), nhiễm trùng xoang và tai, các bệnh về tim hoặc phổi tiềm ẩn trầm trọng hơn, tử vong	1 liều mỗi năm 2 liều ở một số trẻ từ 6 tháng tuổi đến 8 tuổi
<b>COVID-19</b> Tình trạng nhiễm siêu vi truyền nhiễm ở mũi, họng hoặc phổi; có thể cảm thấy như bị cảm lạnh hoặc cúm. Lây qua không khí và tiếp xúc trực tiếp	Nhiễm trùng phổi (viêm phổi); cục máu đông; tổn thương gan, tim hoặc thận; Covid kéo dài; tử vong	1 hoặc nhiều liều thuốc chủng ngừa ngừa COVID-19 cập nhật 2023-2024 tùy theo tình trạng sức khỏe. Để biết thêm thông tin: <a href="http://www.cdc.gov/covidsschedule">www.cdc.gov/covidsschedule</a>
<b>RSV (Respiratory syncytial virus)</b> Tình trạng nhiễm siêu vi truyền nhiễm ở mũi, họng và đồi khi là phổi, lây qua không khí và tiếp xúc trực tiếp	Nhiễm trùng phổi (viêm phổi) và tiêu khí quản của hai lá phổi; đặc biệt nguy hiểm đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ	1 liều vào tuần thai thứ 32 đến tuần thứ 36, trong thời gian từ tháng 9 đến tháng 1 ở hầu hết các vùng lục địa Hoa Kỳ
<b>Mpox</b> Tình trạng nhiễm siêu vi truyền nhiễm lây qua tiếp xúc gần gũi, thường xuyên giữa da kề da, bao gồm cả quan hệ tình dục; gây nổi sảy đau đớn, sốt, nhức đầu, mệt mỏi, ho, sổ mũi, đau họng, sưng hạch	Các vết loét nhiễm trùng, sưng não, nhiễm trùng phổi (viêm phổi), nhiễm trùng mắt, mù lòa, tử vong	2 liều
<b>Bệnh sốt xuất huyết</b> Tình trạng nhiễm siêu vi lây qua vết cắn của muỗi bị nhiễm bệnh; gây sốt, nhức đầu, đau sau mắt, nổi sảy, đau khớp, đau nhức cơ thể, buồn nôn, chán ăn, cảm thấy mệt mỏi, đau bụng	Chảy máu nghiêm trọng, co giật, sốc, tổn thương gan, tim và phổi, tử vong	3 liều

\*Tdap phòng ngừa bệnh uốn ván, bạch hầu và ho gà

\*\*Thiếu niêm khỏe mạnh: Thuốc chủng ngừa viêm màng não ACWY (2 liều); Thuốc chủng ngừa viêm màng não B (2 liều nếu cần).